

# Lagerempfehlungen für Äpfel für die Obstregion Bodensee

Sorte	Lagerart	Erntetermin A = Anfang M = Mitte E = Ende	Lagerdauer	Lagerbedingungen			Bemerkungen
				Temperatur °C	Kohlendioxid % CO <sub>2</sub>	Sauerstoff % O <sub>2</sub>	
Boskoop	Kühl	E.Sept/A.Okt	E.Jan	3-4	-	-	CO <sub>2</sub> -empfindlich, Stippe, Schalen-, Fleisch-, Kernhausbräune
	CA		E.Mär	3-4	<1,5	1,5-2	
Braeburn	Kühl	M.Okt.	E.Jan	1	-	-	sehr CO <sub>2</sub> -empfindlich, Stippe, Fleischbräune für CA früher ernten, CA 3 Wochen verzögern
	CA		E.Mai	1-2	<1,2	1,2-1,5	
Cox Orange	Kühl	A./M.Sept.	E.Dez	3-4	-	-	CO <sub>2</sub> -empfindlich, Stippe, Schalen-, Fleisch-, Kernhausbräune
	CA		E.Mär	3-4	<1,5	1,2-1,5	
Cameo	Kühl	A./M.Okt	E.Dez	1	-	-	Unterentwickelte Schattenfrüchte zuerst 2 Monate <1,5% CO <sub>2</sub> oder mit verzögertem CA lagern
	CA		E.Jul	1-2	3-4	1-1,5	
Elstar	Kühl	A./M.Sept.	E.Dez	1	-	-	schneller Festigkeitsverlust, innere Fleisch- verbräunung, bei Gefährdung CA verzögern
	CA		E.Apr	1-2	<2	1-1,5	
Fuji	Kühl	M/E.Okt	E.Jan	1	-	-	Glaskigkeit, Gefahr von Fleischbräune bei Gefährdung CA verzögern
	CA		M.Jun	1-2	<1,5	1,5-2	
Gala	Kühl	A./M.Sept.	A.Jan	1	-	-	Geschmacksverlust bei zu langer Lagerung
	CA		E.Mai	1-2	3-4	1-1,5	
Golden Del.	Kühl	A./M.Okt.	E.Dez	1	-	-	Bei nicht optimalen Bedingungen: Altersschalenbräune
	CA		E.Jul	1-2	3-4	1-1,5	
Idared	Kühl	A./M.Okt.	E.Mär	2	-	-	etwas kälte- und CO <sub>2</sub> -empfindlich
	CA		A.Jul	2-3	2	1-1,5	
Jonagold	Kühl	E.Sept/M.Okt	E.Jan	1	-	-	Bei nicht optimalen Bedingungen: fettige Schale, Altersschalenbräune
	CA		E.Jul	1-2	3-4	1-1,5	
Kanzi	Kühl	E.Sept/A.Okt	E Febr	3	-	-	nicht zu spät ernten Kälte und CO <sub>2</sub> empfindlich, CA 3 Wo. verzögern
	CA		E Mai	3,5	<1,5	1-1,5	
Pinova	Kühl	E.Sept/A.Okt	M.Jan	1	-	-	anfällig gegenüber Lagerfäulen
	CA		A.Jun	1-2	3-4	1-1,5	
Rubinette	Kühl	M./E. Okt	E.Dez	1	-	-	bei zu später Ernte schneller Festigkeitsverlust und Fleischverbräunungen
	CA		A.Mär	1-2	<1.5	1,2-1.5	
Santana	Kühl	M./E. Okt	A.Dez	2	-	-	bei später Ernte, stark CO <sub>2</sub> empfindlich Festigkeitsverlust und Fleischverbräunungen
	CA		A.Febr	2-3	<1	1,2-1.5	
Topaz	Kühl	E.Sept/A.Okt	M.Feb	1	-	-	Bei zu später Ernte schnell weich und fettig, anfällig gegenüber Lagerfäulen
	CA		M.Jun	1-2	3	1-1,5	

Streif, KOB-Bavendorf 08/2009