


Pflanzenschutz - Warndienst Bodensee

Übergebieliche Pflanzenschutzberatung Obstbau
des Landwirtschaftsamtes Bodenseekreis am KOB-Bavendorf



Obstbau

Nr. 22

Mittwoch, 26.05.2021

Vegetationsstand/Witterung: Die Birnen sind im Stadium BBCH 71-72, Äpfel im Stadium BBCH 69-71. Die Wetterprognosen suchen ihresgleichen. Ab Morgen soll es beständiger werden, es kann auch regnen. Der stürmische Wind soll ab Freitag nachlassen. Einzelne Modelle zeigen auf Sonntag erneut Niederschläge an.

Kernobst

Schorf/Mehltau: Die Ascosporen-Saison ist weitestgehend beendet. Der Schorfzustand der Anlagen sollte jetzt durch Kontrollen ermittelt werden. Abhängig vom Schorfbefall sind ab jetzt wöchentliche bis zehntägige Behandlungen bzw. eine Belagserneuerungen nach mehr als 25 - 35 mm Niederschlag anzustreben. Verwenden Sie Dithianon- oder Captan-haltige Fungizide unter Zusatz eines Mehltaufungizides wie z. B. Systhane 20 EW (0,125 l/ha/m; max. 4x/Saison) oder Talendo (0,125 l/ha/m; max. 3x/Saison; WZ= 49 Tage) bis max. 60 Tage Vorernte (VE) oder Topas (0,125 l/ha/m; max. 3x/Saison) bis 30 Tage VE. Beachten Sie die Verträglichkeits-Probleme bei z. B. *Braeburn*, *Kanzi* und *Gala* bezüglich Mischungen von Captan- mit Netzschwefel-Präparaten. Hier sollte auf Netzschwefel verzichtet werden.

Blutlaus: Der Befallsdruck ist auf vergleichsweise geringem Niveau. In Problemanlagen hat die Koloniebildung am Holz deutlich eingesetzt, die Überwanderung der Larven auf die Neutriebe hat begonnen. Zur Regulierung der Blutlaus ist Movento SC 100 (Art. 53; 0,75 l/ha/m; max. 2,25 l/ha; max. 2x/Saison; bienengefährlich!) genehmigt. Der Einsatz sollte nach der Blüte bei wüchsigem Wetter erfolgen und ist deshalb ab dieser Woche möglich. Vorab mulchen! Movento SC 100 hat eine gute Nebenwirkung auf Obstbaumspeinnmilben und Blattläuse. Die Nebenwirkung auf Apfelrostmilben und die bereits geschlüpfte Kommaschildlaus ist sehr gut. Die Fa. Bayer empfiehlt ausdrücklich den Solo-Einsatz des Produktes mit erhöhter Brühemenge.

Obstbaumspeinnmilbe: Zurzeit finden sich auf Rosettenblättern und untersten Langtriebblättern noch Larven und Alttiere. Die Sommereiblage hat eingesetzt. Sind erst wenige Sommereier abgelegt und überwiegend bewegliche Stadien vorhanden, kann in dieser Woche noch Milbeknock bzw. Milbeknock Top (0,625 l/ha/m; max. 1x/Saison; bienengefährlich!) eingesetzt werden. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Mischbarkeit und Sortenunverträglichkeit. Ansonsten zuwarten und auf die Masse der Sommereier den Einsatz von Envidor (0,2 l/ha/m; max. 1x/Saison; bienengefährlich! Ende Aufbrauchfrist 31.01.2022) einplanen.

Birnenblattsauger: Der Befall in den Anlagen ist sehr unterschiedlich! Zurzeit finden sich geflügelte Tiere, die Eiablage hat begonnen. Nur in stark befallenen Anlagen ist frühestens in der Folgewoche die erste Behandlung mit Movento SC 100 auf dottergelbe Eier und erste Larven einzuplanen. In schwächer befallenen Anlagen kann versucht werden, mit einer Behandlung auszukommen und nachfolgend mit schonenden Präparaten wie Kumar und Neudosan Neu den Befall zu reduzieren.

Apfelwickler: Kontrollen in Problemflächen zeigten noch keine Eiablagen.

Steinobst/Strauchbeerenobst

Blattkrankheiten/Fruchtfäulen: Bei Kirschen mit Marktanlieferung Einsatz von Systhane 20 EW (0,225 l/ha/m; max. 2x/Saison; bis max. 45 Tage VE), danach Einsatz von Score (0,075 l/ha/m; max. 3x/Saison; bis max. 30 Tage VE). Zur Fruchtreife Einsatz von Signum (0,25 kg/ha/m; max. 3x/Saison; WZ= 7 Tage) einplanen. In Zwetschen noch Einsatz von z. B. Score (0,075 l/ha/m; max. 3x/Saison).

Kirschfruchtfliege (KFF)/Kirschessigfliege (KEF): Überwachen Sie den Flug der Tiere mit Gelbtafeln und Saftfallen.

Mehltau an Stachel- und Johannisbeeren: Einsatz von z. B. Flint (0,2 kg/ha; max. 3x/Saison; WZ= 14 Tage) oder Talendo (0,375 l/ha; max. 2x/Saison; WZ= 7 Tage). Vor der Ernte Einsatz von Kumar in verminderter Aufwandmenge einplanen.

Hinweise zum Bienenschutz: Tankmischungen von Mospilan SG und Azolen (z. B. Systhane 20 EW, Score, Luna-Produkte u. a.) sind bienengefährlich! Movento SC 100, Envidor und Milbeknock sind bienengefährlich! Einsatz nur in abgeblühten Beständen, Fahrgassen mulchen. Der Herbizidstreifen muss frei von blühenden Kräutern sein.

Übergebieliche Pflanzenschutzberatung Obstbau/ Pflanzenschutzdienst des LRA Bodenseekreis

Tel.: 0751-7903-305 /-306; Mobil 0175-723 10 06 (Herr Trautmann); Fax 0751-7903-309, Warndiensttelefon: 01805-197 197 37 (Festnetzpreis 0,14 €/min; Mobilfunkpreise max. 0,42 €/min). Die Angaben ersetzen nicht die Gebrauchsanleitung; insbesondere sind die Anwendungsbestimmungen zu beachten. Haftungsausschluss: Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand der Verfasser. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie eine Haftung für Irrtümer oder Nachteile, die sich aus der Empfehlung bestimmter Präparate oder Verfahren ergeben könnten, wird nicht übernommen.